

Tableau récapitulatif des médicaments

Médicaments	Mise en œuvre	Intérêts	Effets secondaires	Éléments à surveiller
Amoxicilline (Clamoxyl®) Antibiotique antibactérien (bétalactamine)	Donner 2 cuillères mesure 3 fois/j (8 h, 12 h, 18 h)	Utilisation limitée aux infections dues aux germes définis comme sensibles. Traitement initial : – pneumopathies aiguës – surinfections de bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques – infections urinaires...	Manifestations allergiques, notamment urticaire, œdème de Quincke, gêne respiratoire... Eruptions cutanées d'origine allergique ou non. Exceptionnellement, quelque cas de syndrome de Steven-Johnson, de dermatite Troubles digestifs (vomissement, nausée, diarrhée, candidose)	L'état cutané, le transit intestinal, la température, la tolérance au traitement, l'apparition d'effets indésirables, l'efficacité du traitement
Coumadine (2 mg) Antithrombotique	1 cp à 18 h	Utilisé dans les cas de : – cardiopathies emboligènes – infarctus du myocarde (prévention des complications et des récurrences) – traitement des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire ainsi que la prévention de leurs récurrences – prévention des thromboses veineuses et de l'embolie pulmonaire en chirurgie de hanche – prévention des thromboses sur cathéter.	Manifestations hémorragiques (hématome intracérébral, hémorragie intra-abdominale, intra-articulaire...) : complications les plus fréquentes : – diarrhée – arthralgies isolées – plus rarement : alopecie et nécrose cutanée localisée	L'apparition des effets indésirables, l'efficacité du traitement, le transit, l'apparition de douleurs, l'apparition de saignements ou d'hématome
Diffu K® Supplémentation potassique	2 cp/j : un à 12 heures et un à 18 heures	Utilisé dans le cas du traitement des hypokaliémies, en particulier médicamenteuses (saldurétiques, diurétiques, laxatifs).	Hyperkaliémie (avec risque de mort subite) : celle-ci est à prévenir par le contrôle de la kaliémie À forte dose, possibilité d'ulcération gastro-duodénale	Bilan sanguin à la recherche d'un taux de potassium élevé, Apparition de douleurs gastriques, cardiaques, thoraciques.
Forlax® (10 g) Laxatif osmotique	1 sachet 3 fois/semaine (les mardi, jeudi et samedi)	Utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 8 ans. Une cause organique devra être écartée avant d'initier le traitement.	Fréquents : distension et douleurs abdominales, nausées, diarrhées Peu fréquents : vomissements et, le plus souvent, conséquence de la diarrhée, besoin impérieux d'aller à la selle, incontinence fécale.	Le transit intestinal L'apparition de la douleur La tolérance du traitement