## Situation clinique 1er cas

On vous charge de vous occuper de donner à manger à un nouveau venu dans votre service,
M. Michu, 76 ans, qui est hospitalisé en SSR suite à un AVC.

Il présente une hémiplégie droite et une légère aphasie d'expression.
En revanche, votre collègue vous dit qu'il comprend tout, seulement il faut parler fort.
Ce patient a tendance à manger très vite sans mastiquer et tousse un peu parfois pendant le repas. En plus, son dentier ne tient pas très bien.
Elle n'a pas le temps de vous en dire davantage, elle vous laisse prendre la suite.

Quels seront vos points de vigilance dans votre prise en soin clinique ?

## Situation clinique 2ème cas

Mme Michu, 83 ans, est une nouvelle résidente de l'EHPAD dans lequel vous travaillez.
Elle a chuté à domicile et s'est cassée la hanche. Elle doit maintenant se déplacer en fauteuil roulant et ne peut plus rester chez elle.
A son admission, le médecin a repéré quelques troubles cognitifs : elle a du mal à se repérer dans la journée, perd un peu la mémoire et ne sait plus toujours se servir des objets autour d'elle.
Vos collègues, qui l'ont déjà accompagnée pendant un repas, ont remarqué qu'elle avait tendance à se racler la gorge entre les bouchées et qu'elle toussait quand elle buvait en penchant la tête vers l'arrière.

Quels seront vos points de vigilance dans votre prise en soin clinique ?